

Ozempic® je podobný přírodnímu, tělem vyráběnému hormonu, který se v organismu uvolňuje po jídle. Pomáhá snižovat hladinu cukru v krvi, pokud je příliš vysoká, a může napomoci předcházet srdečnímu selhání.



Nejtenčí jehla pro GLP-1 RA
s dávkováním jednou týdně

4mm jehla NovoFine® Plus 32G



Uchování pera Ozempic®


Před otevřením - uchovávejte v lednici při teplotě od 2 do 8 °C .

Po otevření - uchovávejte při teplotě do 30 °C po dobu 6 týdnů, nebo v ledniče při teplotě od 2 do 8 °C

Aplikace Ozempic®

- Aplikujte jednou týdně ve stejný den nezávisle na jídle
- **Před aplikací nasadte na pero novou jehlu**, poté nastavte požadovanou dávku dle ordinace lékaře. Aplikujte injekci pod kůži a zmáčkněte dávkovací tlačítko, dokud se neobjeví nula, pomalu počítejte do 6 a jehlu vytáhněte. Použité jehly zlikvidujte dle pokynů ambulance.


ZAČNI	ZVYŠ	ZŮSTAŇ
0,25 mg po dobu 4 týdnů	0,5 mg po dobu nejméně 4 týdnů	0,5 mg nebo 1 mg podle individuální kompenzace glykémie



KROK 1

Kontrola pera a vložení nové jehly

Ujistěte se, že pero obsahuje **čirý a nezabarvený** přípravek Ozempic®. Našroubujte novou jehlu a sejměte **oba** její ochranné díly.



KROK 2

Kontrola průtoku

U každého **nového** pera pootočte voličem dávky, zvolte **symbol kontroly průtoku** (■ ▬). Stiskněte a podržte dávkovací tlačítko. Opakujte, až se objeví kapka.



KROK 3

Volba dávky


Otáčejte voličem dávky, až se na počítadlu dávky objeví vámi používaná dávka (0,25 mg nebo 0,5 mg).



KROK 4

Aplikace dávky

Zaveďte jehlu pod kůži. Stiskněte a podržte dávkovací tlačítko, dokud volič dávky neukazuje 0, **pomalů počítejte do 6**.




KROK 5

Vyjmutí jehly

Opatrně vyjměte jehlu a vyhodte ji. Nasadte uzávěr na pero.

Místa vpichu

Přední strana stehen, břicho, horní část paží



Co dělat, když zapomenou

Pokud od zapomenuté dávky uplynulo více než 5 dní, vynechejte ji a další dávku si aplikujte v příští plánovaný den.

pondělí	úterý	středa	čtvrtek	pátek	sobota	neděle	pondělí
ZAPOMENUTÁ DÁVKA	VEZMĚTE ZAPOMENUTOU DÁVKU				VYNECHEJTE DÁVKU		DALŠÍ DÁVKA

Vedlejší účinky Ozempic®

Nejčastější vedlejší účinky jsou nevolnost a průjem, které se postupem času zmírňují. Pokud budete trpět nevolností, může Vám pomoci:

- Jezte pomalu, častěji a menší porce
- Pijte hodně vody
- Nejezte příliš sladkého
- Nejezte v místech, kde je cítit zápach z vaření, zejména tučného jídla